

**EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL**

Sesiunea 2018

<b>SPECIALITATEA</b> <b>IGIENIST DE CABINET</b> <b>STOMATOLOGIC</b>
---

**TEST - GRILĂ**  
**DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR****1. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**

- a) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență;
- b) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
- c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului.

**2. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență**

- a) nu este obligatoriu consimțământul reprezentantului legal fiind vorba despre un minor
- b) consimțământului este opțional
- c) consimțământul trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență

**3. Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr.144/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare**

- a) constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal
- b) nu este prevăzută ca sancțiune
- c) nu se pedepsește

**4. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical are drept scop:**

- a) asigurarea libertății de expresie
- b) apărarea demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical
- c) recunoașterea meritelor în exercitarea profesiei

**5. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali generalisti, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională**

- a) obligatorie

- b) nu este obligatorie.
- c) optional

**6. Precizați care din următoarele afirmații este adevărată:**

- a) asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA
- b) între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate
- c) păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane

**7. Constituie încălcarea a regulilor etice:**

- a) înscrierea într-o organizație sindicală. conducerea sub influența bauturilor alcoolice / exprimarea unei opinii politice / înscrierea într-un partid politic
- b) nerespectarea programului de lucru
- c) jignirea, calomnierea și defăimarea profesională

**8. Dovada calității de membru al OAMGMAMR se face cu:**

- a) certificatul de membru
- b) orice alt document
- c) diploma de studii

**9. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:**

- a) orice documente
- b) documente de studii care atestă formarea în profesie
- c) certificatul de membru

**10. Fișa postului de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se avizează de către:**

- a) nu se avizează
- b) angajator
- c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România

**11. Secretul profesional:**

- a) nu este obligatoriu
- b) are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei
- c) nu există și față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar neinteresate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului

**12. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:**

- a) avertisment
- b) muștrare
- c) suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate

**13. Înscrierea asistenților medicali generaliști, moșelor și asistenților medicali se face la:**

- a) Ministerul Sănătății;
- b) Direcția de Dănatate Publică.
- c) filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România

**14. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moșei și asistentului medical este un document care cuprinde:**

- a) proceduri de practică pentru asistenți medicali;
- b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moșei și asistentului medical în exercitarea profesiei;
- c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moșă și de asistent medical.

**15. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moșă și de asistent medical sunt realizate de:**

- a) Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
- b) alte organizații profesionale
- c) organizații sindicale

**16. La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România, depunerea jurământului este:**

- a) obligatorie
- b) opțională
- c) nu este obligatorie.

**17. Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moșă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr.144/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare**

- a) nu este prevăzută ca sancțiune
- b) constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal
- c) nu se pedepsește

**18. Este nedemn și nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moșă și, respectiv, asistent medical:**

- a) asistentul medical generalist, moșă și, respectiv, asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea oricărei infracțiuni
- b) asistentul medical generalist, moșă și asistentul medical care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei și asistentul

medical generalist, moașa și asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei

c) numai asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical căruia i s-a aplicat sancțiunea interzicerii exercitării profesiei

**19. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru:**

a) nu este obligatorie încheierea unei asigurări de răspundere civilă

b) pentru bunuri

c) greșeli în activitatea profesională

**20. Precizați care din următoarele afirmații este adevărată:**

a) prin orice alte documente

b) calitatea de membru este dovedită prin documentele de studii care atestă formarea în profesie

c) calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care se eliberează la înscrierea în organizația profesională

**21. Cauza cea mai frecventă a papilitei este:**

a) iritația mecanică din timpul actului masticator sau a periajului

b) tratamentul ortodontic incorect

c) iritația cu pansament arsenical

**22. Un pacient prezintă un abces paradontal la nivelul feței distale a molarului secund superior. Durerea și mobilitatea sunt moderate iar dintele este integru din punct de vedere odontal. Tratamentul de elecție este:**

a) extracția dintelui

b) prescrierea unui antibiotic pe cale generală

c) deranjul abcesului

**23. La autoclav sterilizarea se realizează:**

a) prin vapori de apă sub presiune

b) prin acțiunea radiațiilor ionice

c) prin aer cald

**24. Erupția dinților permanenți are lor:**

a) între lunile a 6-a și a 30-a

b) de-a lungul unui interval de 2 ani

c) între 6 și 12-13 ani (24 ani)

**25. Extracția dentară se poate efectua fără riscuri hemoragice dacă timpul de sângerare este de:**

a) 20-30 minute

b) 1-4 minute

c) 15-20 minute

**26. Pregătirea instrumentarului pentru examinări curente:**

a) se spală cu apă și săpun, se clătesc, se pun în soluție dezinfectantă

b) se spală cu apă și săpun, se pun la sterilizat

c) se pun în soluție de decontaminare, 30-60 min, se spală cu apă și săpun, se clătesc, se pun în soluție dezinfectantă se clătesc, se sterilizează

**27. Placa dentară este formată inițial din:**

- a) particule alimentare și mucina salivară;
- b) celulele epiteliale descumate și mucina salivară;
- c) bacterii și produși bacterieni;

**28. Normal la dentiția temporară:**

- a) primul dinte erupe la 3 luni
- b) primul dinte erupe la 6 luni și este incisivul central inferior
- c) primul dinte erupe la 4 luni și este incisivul central inferior

**29. Adrenalina acționează direct asupra inimii, producând:**

- a) scăderea randamentului cardiac
- b) scăderea forței de contracție
- c) creșterea presiunii sistolice și diastolice

**30. Pasta de dinți se folosește:**

- a) lunar
- b) la periajul zilnic
- c) săptămânal

**31. Mepivacaina:**

- a) are toxicitate egală cu procaina
- b) are acțiune vasoconstrictoare
- c) are acțiune slabă vasodilatatoare

**32. Asepsia reprezintă:**

- a) ansamblul metodelor care permit protejarea organismului împotriva contaminării cu germeni microbieni din exterior în cursul unei manopere medico-chirurgicale
- b) metoda de distrugere a microorganismelor din abcese
- c) metoda de tratament cu antibiotice

**33. Elementele de diagnostic pozitiv ale cariei simple sunt:**

- a) prezența dentinei ramolite;
- b) retracția gingivală;
- c) percuția în ax pozitivă;

**34. La vârsta de 6 ani erup:**

- a) primii molari inferiori, primii molari superiori și incisivii centrali inferiori
- b) primii molari inferiori, primii molari superiori și incisivii centrali superiori
- c) primii molari superiori, primii molari inferiori și caninii superiori

**35. În urma cimentării unei unidentare cu un ciment fosfat de zinc se obține o:**

- a) legătură covalentă între și bont
- b) lipire a protezei pe bont
- c) sigilare a spațiului dintre bont și microproteză

**36. Distrofiile dentare se diferențiază în caria simplă prin:**

- a) prinderea de suprafață dură dentară
- b) lipsa dentinei alterate
- c) teste de vitalitate pozitive

**37. Pentru precizarea diagnosticului chirurgical se folosesc următoarele:**

- a) hemoleucograma
- b) radiografia
- c) colorarea cu albastru de toluidina 1%

**38. În leucemia acută, extracția dentară se efectuează:**

- a) sub protecție hemostatică
- b) sub protecție de antibiotice
- c) este contraindicată

**39. Tratamentul curativ în alveolita postextracțională urmărește:**

- a) oprirea hemoragiei
- b) combaterea anxietății
- c) combaterea infecției

**40. Circuitul instrumentelor este un principiu ce nu permite nici o abatere. Identificați-o:**

- a) separarea totală a instrumentelor sterile de cele nesterile
- b) folosirea aceluiași instrumente la mai mulți, pacienți
- c) pe măsuta cu instrumente a unitului se așează toate instrumentele folosite și cele ce vor fi folosite pentru un pacient

**41. La bolnavii cu stomatită acută extracția dentară se efectuează:**

- a) de urgență
- b) sub protecția hemostatică
- c) se temporizează

**42. Caninul superior permanent erupe normal la:**

- a) 10 ani
- b) 9 ani
- c) 11 ani

**43. Trusa de instrumente necesare rezecției apicale cuprinde:**

- a) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, clești pentru extracție, ciupitor de os
- b) oglindă, pensă, sondă, spatulă bucală, ace pentru sutură, linguri pentru amprentă, instrument de detartraj
- c) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, bisturiu, foarfece, decolatoare, instrumentul pentru trepanație osoasă, chiurete, pensă port ac, ace de sutură, seringi pentru anestezie, materiale pentru sutură, instrumentar mic pentru canale, freze, materiale pentru obturație

**44. Molarii apar la vârsta de:**

- a) 6 ani, 12 ani, după 18 ani

- b) 5 ani
- c) 18 ani

**45. Ce materiale sunt indicate de a fi folosite, ca bază, sub restaurări fizionomice compozite?**

- a) ciment ionomer de sticlă
- b) zinc oxid eugenol
- c) lineri pe bază de hidroxid de calciu

**46. În secțiune, chiuretele paradontale de detartraj au formă:**

- a) aproximativ semicirculară
- b) triunghiulară
- c) pătrată

**47. În cazul femeilor gravide se recomandă evitarea traumatismelor operatorii în următoarele perioade de sarcină:**

- a) prima lună
- b) primele trei luni (perioada de organogeneză)
- c) primele două luni

**48. La autoclav sterilizarea instrumentelor în cutii metalice se realizează:**

- a) 15 min la 60 grade C
- b) 30 min la 120 grade C
- c) 10 min la 60 grade C

**49. Cea mai frecventă cauză a ectopei de canin este:**

- a) existența unui copac osos dens
- b) existența unei fibromuscoase dense
- c) reducerea sau absența pe arcadă

**50. Dintele afectat de abces parodontal este:**

- a) sensibil la periuța în ax
- b) foarte mobil
- c) ușor mobil

**51. Durata periajului dentar este de:**

- a) 1 minut
- b) 30 secunde
- c) 3-5 minute

**52. Specificați care au fost primele cimenturi utilizate pentru restaurarea definitivă a leziunilor dentare, în special la dinții frontali:**

- a) ZOE
- b) CIS
- c) CS (CIMENT SILICAT)

**53. Toaleta cavității în vederea efectuării tratamentului plăgii dentare se face cu ajutorul:**

- a) apă oxigenată

- b) ser fiziologic
- c) apă distilată

**54. Materialul moale se sterilizează:**

- a) la pupinel
- b) la autoclav
- c) prin fierbere

**55. Gingivita din leucemia acută:**

- a) este difuză și cronică
- b) se asociază cu paloare și serologie pozitivă
- c) se asociază unor leziuni hemoragice

**56. După ce se recunoaște dentina sănătoasă, în cursul preparării cavităților:**

- a) aspect;
- b) consistență;
- c) culoare;

**57. Care este tipul de acțiune al acidului pentru a realiza gravarea acidă a smalțului?**

- a) 30 secunde
- b) 40 secunde
- c) 15 secunde

**58. Schimbarea perilor de dinți este bine să se facă:**

- a) săptămânal
- b) după 3 luni
- c) lunar

**59. În stomatologie și chirurgia orală și maxilo-facială, se folosesc următoarele concentrații de adrenalină adăugate anestezicului local injectabil:**

- a) 1:250 000
- b) 1:150 000
- c) 1:200 000

**60. Detartrajul se efectuează:**

- a) odată pe an
- b) dată la 6 luni
- c) nu este necesar

**61. Cum se realizează corect dezinfectia mâinilor:**

- a) spălarea mâinilor înaintea primului și după ultimul pacient
- b) spălarea mâinilor înainte de fiecare pacient cu apă și săpun, dezinfectia mâinilor cu soluți dezinfectante pentru mâini, ștergere cu șervețele
- c) spălarea mâinilor cu apă și săpun, dezinfectia mâinilor, ștergerea cu prosop

**62. Ordinea în care erup dinții temporari este:**

- a) incisiv central, incisiv lateral, canin, molar unu, molar doi



- b) incisiv central, invinsiv lateral, molar unu, canin, molar doi
- c) incisiv central, incisiv lateral, molar unu, molar doi, canin

**63. Simptomul cel mai frecvent al traumei ocluzale îl constituie prezența:**

- a) fațetelor de abrazie;
- b) fracturilor de smalt;
- c) mobilității dentare;

**64. Specificați temperatura la care componentele plăcilor de Stent's, se pot distruge:**

- a) 60 grade C
- b) 70 grade C
- c) 50 grade C

**65. Gingivita cronică este cauzată de:**

- a) invazia țesutului gingival cu microorganisme;
- b) produșii microorganismelor de la nivelul dinților și țesutului gingival;
- c) trauma ocluzală;

**66. Complicațiile locale ale bolii parodontale**

- a) pulpite purulente
- b) abcesele gingivale
- c) cariile dentare

**67. Pentru prevenirea hemoragiei postextractionale ca tratament local se impun:**

- a) aplicarea de iodoform în plaga alveolară
- b) evitarea chiuretajului alveolar
- c) sutura plăgii alveoale

**68. Testul de vitalitate la rece arată:**

- a) durere la un dinte cu gangrenă
- b) durere de origine pulpară
- c) durere la un dinte devital

**69. Sterilizarea prin aer cald se efectuează în pupinel la:**

- a) la 60 grade C
- b) 180 grade C
- c) 100 grade C

**70. Xilina este:**

- a) insensibilă la lumină
- b) insolubilă în apă
- c) solubilă în apă

**71. Examinarea unui bolnav cu o afecțiune oromaxilofacială urmează următoarele etape;**

- a) examenul loco-regional, radiografii dentare
- b) examenul loco-regional, examene paraclinice de laborator

c) anamneza, examenul loco-regional, examenul general, examene paraclinice de laborator, oculzia, radiografi dentare, model de studiu

**72. Osul alveolar al copilului mic:**

- a) nu este acoperit de periost
- b) este extrem de dens
- c) este mai puțin dens

**73. Identificați formula dentară corectă:**

- a) I.=2/2; C.=1/1, P.M.=2/2; M. =3/3
- b) I. =2/2; C. =1/1; P.M.=3/3; M.=2/2
- c) I.=2/2; C.=1/1; P.M. =1/1; M.=2/2

**74. Care este formula corectă privind forma și rolul dinților:**

- a) incisivii, dinți lați cu margini tăioase care servesc la tăiatul alimentelor
- b) premolarii au forma conică cu rol în masticăție
- c) caninii au pe suprafața lor mici ridicături cu rol la măcinarea alimentelor

**75. Identificați formula dentară la dinții de lapte:**

- a) I. =2/2; C. =1/1; M.=2/2
- b) I.=1/1; C. = 1/1; M. =3/3
- c) I.=2/2; C. = 1/1; P.M.=2/2; M.= 3/3

**76. Autocurățirea se realizează prin:**

- a) folosirea de dentifride
- b) masticăția fiziologică
- c) periaj dentar riguros

**77. Dacă un pacient își controlează elicient placa, care este intervalul necesar efectuării profilaxiei?**

- a) nici unul;
- b) 3 luni;
- c) 6 luni;

**78. Care din urmatoarele procedee reduc mobilitatea dentară?**

- a) toate;
- b) îndepărtarea traumei ocluzale;
- c) șlefuirea selectivă;

**79. Incizia abcesului de loja submandibulă necesită:**

- a) anestezie generală prin intubație oro-traheală
- b) anestezie locală de contact
- c) anestezie generală de scurtă durată

**80. Extracția dentară este contraindicată în:**

- a) diabet
- b) S.I.D.A
- c) leucemie

**81. Care este cel mai folosit instrument pentru plasarea pastelor în canalele radiculare:**

- a) plugger
- b) acul Lentullo
- c) spreader

**82. Perile de dinți moi sunt indicate pentru:**

- a) suprafețe linguale
- b) suprafețe ocluzale
- c) șanțul gingival

**83. Cea mai frecventă boală parodontală este reprezentată de:**

- a) parodontită;
- b) hipertrofia gingivală;
- c) gingivită;

**84. Gradul de evaluare a igienei buco-dentară se face prin:**

- a) model de studiu
- b) consult stomatologic
- c) colorarea plăcii dentare

**85. Dezavantajele periilor de dinți cu peri naturali sunt:**

- a) nu elimină în totalitate placa bacteriană
- b) produc traumatisme gingivo-dentare
- c) se îmbibă cu apă și detritusuri organice

**86. La o plagă alveolară normală urmărim:**

- a) introducerea de meșe iodoformate în alveolă
- b) chiuretaj alveolar
- c) formarea cheagului și protejarea lui

**87. Erupția dinților temporari începe cu:**

- a) caninii superiori
- b) incisivii centrali inferiori
- c) incisivii centrali superiori

**88. Precizați care dintre elastomerii de sinteză suferă cel mai redus proces de contracție în primele 24 de ore:**

- a) siliconii cu reacție de adiție
- b) paste de zinc-oxid-eugenol
- c) siliconii cu reacție de condensare

**89. În ce zonă a coloanei dentare smalțul are grosimea maximă:**

- a) la ecuatorul coronar
- b) coletul molarilor
- c) cuspizi molarilor

**90. Un cabinet stomatologic este dotat cu:**

- a) unit dentar, fotoliu dentar, aparat de detartraj
- b) unit dentar, fotoliu dentar, instrumentar
- c) unit dentar, fotoliu dentar, compresor, aparatură de sterilizat, instrumentar

**91. Atitudinea față de plăgile postextractionale simple este:**

- a) drenaj
- b) sutura plăgii
- c) oprirea hemoragiei prin simplu tamponament

**92. Dezinfecția reprezintă:**

- a) distrugerea agenților microbieni din cavitatea bucală
- b) distrugerea microbilor patogeni existenți în afara corpului uman
- c) o metodă de distrugere a microbilor din abcesul dentar

**93. Rezorbția rădăcinilor dinților temporari începe:**

- a) imediat după încheierea formării rădăcinii
- b) la 6 luni după încheierea formării rădăcinii
- c) cu 3-4 ani înainte de înlocuire

**94. La unele cimenturi ionomere de sticlă acidul poliacrilic a fost înlocuit cu acidul polimaleic sau poliitaconic, fapt care permite utilizarea unor sticle aluminosilicate mai:**

- a) instabile, pentru a putea fi mai ușor atacate de poliacid
- b) mari
- c) stabile

**95. În cazul pacienților cu angina pectorală se va da prioritate următoarelor anestezice loco-regionale:**

- a) Octapresina
- b) Procaina
- c) Xilina

**96. Periajul frecvent previne formarea tartrului prin:**

- a) neutralizarea acidității locale;
- b) dezorganizarea matricei plăcii;
- c) îndepărtarea resturilor alimentare;

**97. Testele de vitalitate (electrice și termice) în cazul pulpopatiilor dinților permanenți tineri sunt:**

- a) furnizează date precise privind starea pulpei
- b) furnizează date numai prin compararea cu dinții adiacenți și contralaterali
- c) permit cel mult aprecierea stării de vitalitate pulpară

**98. Îndepărtarea contactului prematur de pe un dinte afectat parodontal duce din punct de vedere clinic la dispariția:**

- a) mobilității;
- b) inflamației gingivale;
- c) retracției;

**99. Care din variante este corectă privind alcătuirea externă a unui dinte;**

- a) coroană, pulpă dentară
- b) rădăcină, coroană, colet
- c) rădăcină, smalt

**100. Secreția fluidului gingival**

- a) crește în procesele inflamatorii și bolile hormonale
- b) scade în procesele inflamatorii
- c) crește în procesele inflamatorii;